

LES ANTICOAGULANTS

(Médicaments Antiplaquettaires)

**ASA Kératinisé 81 ou 325 mg
(Aspirin®)**

**Clopidogrel 75 mg
(Plavix®)**

Les anticoagulants (médicaments antiplaquettaires) réduisent le risque d'avoir une autre crise cardiaque. Ils préviennent la formation de caillots dans les artères du cœur, ce qui est particulièrement important si vous avez une endoprothèse dans une artère ou plus. Vous devrez prendre l'ASA (Aspirin®) et le clopidogrel (Plavix®) après la pose d'endoprothèses. Il est important de prendre ces médicaments suivant l'ordonnance à la lettre. ASSUREZ-VOUS DE REMPLIR VOS ORDONNANCES POUR L'ASA (Aspirin®) ET LE CLOPIDOGREL (Plavix®) en quittant l'hôpital. NE CESSEZ JAMAIS de prendre ces médicaments sans d'abord en parler avec le cardiologue, même si un autre professionnel de la santé vous dit d'arrêter.

1. Il faut prendre ces médicaments **UNE FOIS** par jour. Prenez-les chaque jour à la même heure, une heure qui vous convient. Si vous manquez une dose, prenez-la dès que vous y pensez à moins qu'il soit presque l'heure de la dose suivante. **NE PRENEZ PAS** plus de médicament pour compenser la dose manquée.
2. Il n'est pas nécessaire de prendre ces médicaments avec de la nourriture, mais certaines personnes trouvent que l'ASA (Aspirin®) est mieux toléré avec la nourriture puisqu'il peut irriter l'estomac.



Winnipeg Regional
Health Authority
Caring for Health

Office régional de la
santé de Winnipeg
À l'écoute de notre santé



3. L'ASA (Aspirin®) et le clopidogrel (Plavix®) peuvent augmenter le risque de saignements. Si vous vous coupez ou si vous avez un saignement de nez, mettez-y de la pression pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Appelez immédiatement votre fournisseur de soins de santé si vous avez l'un des effets secondaires suivants :

- Maux d'estomac intenses
- Vomi sanglant ou qui ressemble au café moulu
- Selles ou urine sanglantes, selles noires et goudronneuses
- Saignements ou ecchymoses inhabituels ou excessifs

Les effets secondaires moins graves incluent le mal d'estomac, une tendance aux ecchymoses et des brûlures d'estomac (reflux d'acide). Si ces effets secondaires vous causent des problèmes, discutez-en avec le pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé.

4. Les personnes qui prennent le clopidogrel (Plavix®) présentent un risque limité d'avoir une éruption cutanée. Normalement, l'éruption peut être traitée sans que le patient doive cesser de prendre le médicament. Communiquez avec votre fournisseur

de soins de santé si vous avez une éruption cutanée. **NE CESSEZ PAS** de prendre le clopidogrel (Plavix®) à moins qu'on ne vous l'exige.

5. Certains médicaments, y compris ceux en vente libre et ceux à base d'herbes médicinales, contiennent des substances anticoagulantes ou interagissent avec l'ASA (Aspirin®) ou le clopidogrel (Plavix®). Il est important de ne pas prendre d'autres anticoagulants à part ceux prescrits par votre fournisseur de soins de santé, car cela augmentera le risque de saignements. Consultez le pharmacien ou un autre fournisseur de soins de santé avant de commencer à prendre un nouveau médicament. Si vous devez prendre un médicament antidouleur en vente libre, l'acétaminophène (Tylenol®) est le choix le plus sûr.
6. Assurez-vous que tous vos médecins, dentistes ou autres fournisseurs de soins de santé savent que vous prenez ces médicaments. Vous devrez peut-être cesser de les prendre avant de subir certaines chirurgies ou interventions dentaires. Consultez d'abord votre cardiologue avant de cesser de prendre ces médicaments.

N.B. : Ces renseignements ne sont pas destinés à couvrir tous les usages, précautions, interactions ou effets négatifs possibles de ces médicaments. Consultez le pharmacien d'hôpital ou communautaire pour obtenir plus d'information et les réponses à vos questions.



Winnipeg Regional
Health Authority
Caring for Health

Office régional de la
santé de Winnipeg
À l'écoute de notre santé

