

Nom de l'enfant :
Date de naissance de l'enfant :
Date de l'évaluation :

Facteurs	Oui	Non
Nettoyage des dents avec une brosse à dents (ou un linge, dans le cas d'un nourrisson) au moins deux fois par jour par un parent ou le responsable de l'enfant	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)
Exposition quotidienne au fluorure (p. ex. dentifrice fluoré, eau fluorée)	<input type="checkbox"/> (0)	<input type="checkbox"/> (1)
Pratiques d'alimentation (cochez toutes les cases qui s'appliquent) : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alimentation au biberon, enfants de > 12 mois <input type="checkbox"/> Utilisation d'un biberon ou d'un gobelet à bec entre les repas contenant d'autres liquides que de l'eau (boissons gazeuses, jus de fruits, lait, lait au chocolat) <input type="checkbox"/> Utilisation d'un biberon ou d'un gobelet à bec à l'heure du coucher et/ou au moment de la sieste <input type="checkbox"/> Absence d'une routine de soins d'hygiène buccale après avoir introduit des aliments solides dans l'alimentation des enfants de plus de 12 mois au cours de l'allaitement ou de l'alimentation au biberon <input type="checkbox"/> Consommation de collations ou de boissons sucrées entre les repas (p. ex. biscuits, friandises, céréales sucrées, croustilles, boissons gazeuses, jus de fruits, lait au chocolat) 	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (0)
Ménage à faible revenu (difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois)	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (0)
Plaque visible et/ou résidus alimentaires sur les dents	<input type="checkbox"/> (1)	<input type="checkbox"/> (0)
Caries visibles (y compris les lésions blanches) et/ou signes de traitements antérieurs de caries dentaires (plombages, couronnes en acier inoxydable, dent extraite)	<input type="checkbox"/> (3)	<input type="checkbox"/> (0)
Note totale (veuillez additionner les points de chaque colonne)		

Risque carieux global : **Risque élevé** (note ≥ 3) **Faible risque** (note < 3)

RECOMMANDATIONS (Cochez les cases ayant fait l'objet d'une discussion avec les parents/responsables de l'enfant.)

RISQUE ÉLEVÉ
 Si le **risque carieux global est élevé**, recommandez les mesures suivantes, *en plus* de celles visant tous les enfants (voir ci-après) :
 En présence de caries, consulter un dentiste pour obtenir des traitements.
 Appliquer du vernis fluoré *aujourd'hui*.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT TOUS LES ENFANTS

Consulter un dentiste (si l'enfant n'a pas reçu de soins dentaires au cours de la dernière année).

Renseignements et recommandations à l'intention des parents ou des responsables de l'enfant:

Brosser les dents de l'enfant (< 8 ans) au moins deux fois par jour pendant 2 minutes avec :

- o de l'eau ou un dentifrice non fluoré, seulement pour les enfants de 0 à 3 ans, si la note totale est = 0.
- o un frottis (équivalant à la taille d'un grain de riz) de dentifrice fluoré sur les dents des enfants âgés de 0 à 3 ans (si la note totale est > 0).
- o une petite quantité (équivalant à la taille d'un pois vert) de dentifrice fluoré sur les dents des enfants de 3 à 6 ans.

Réduire ou limiter la consommation de sucre (boissons et collations sucrées).
 Éviter de remplir le biberon ou le gobelet à bec avec un liquide autre que l'eau.
 Retirer graduellement le biberon à partir de l'âge de 12 mois au plus tard.
 Commencer à utiliser un verre ou un gobelet sans couvercle avant l'âge de 12 mois.
 Autre : _____



COMMENTAIRES ADDITIONNELS :
 Demande de consultation faite auprès de : _____ **Non requise (l'enfant a déjà consulté un dentiste)**
 Signature du fournisseur: _____

Outil national d'évaluation du risque de la carie (< 6 ans)
 Signes de plaque et de lésions carieuses

Plaque visible et/ou résidus alimentaires



Caries superficielles (lésions blanches)



Caries avancées



Images fournies par le Dr. Robert Schroth

20 décembre 2019